

# Caracterización de usuarios de sustancias en TIJUANA



Servicios de reducción de daños

## DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS


n=50




**HOMBRES (66%) MUJERES (34%)**



### Fuente de ingresos




### Vivienda




## PATRONES DE USO DE SUSTANCIAS

### Sustancias más consumidas



El 73% de los encuestados consumen más de una sustancia.  
Fent + Meta (37%)  
Fent + Hero + Meta (22%)


### Vías de consumo



El 18.5% de los consumidores beben alcohol

## EXPERIENCIA DE SOBREDOSIS


● Opioides ● Estimulantes




El 45% de los encuestados ha sufrido una sobredosis por opioides mientras que el 6% reportó sobredosis por estimulantes.

## ¿QUÉ SE HIZO PARA AYUDAR?


De las personas encuestadas que experimentaron una sobredosis, el 77.3% recibió naloxona. Sin embargo, el 45.5% de los casos aún fue atendido con métodos empíricos o de alto riesgo, y solo en un 9.1% de las emergencias se solicitó ayuda a los servicios médicos.




Uso de Naloxona



Métodos no médicos



Atención médica



Otro


## ACCESO Y USO DE NALOXONA

**96%**

de los encuestados tienen acceso a naloxona

Aunque prácticamente la totalidad de la población encuestada tiene acceso a la naloxona (96%), su uso en emergencias aún muestra margen de mejora, siendo la aplicación de la misma casi exclusivamente entre pares.

## LA NALOXONA SALVA VIDAS



Existe una fuerte red comunitaria de supervivencia. Es urgente desestigmatizar el uso de sustancias, capacitar en la aplicación de naloxona e integrar servicios médicos empáticos y libres de criminalización.